

みつかる。
つながる。
よくなっていく。

後援：札幌市教育委員会、音更町教育委員会、帯広市、帯広市教育委員会、仙台市教育委員会、
新宿区、新宿区教育委員会、文京区教育委員会、千代田区教育委員会、中野区教育委員会、
港区教育委員会、江東区教育委員会、所沢市教育委員会、神奈川県、神奈川県教育委員会、
横浜市教育委員会、川崎市教育委員会、藤沢市教育委員会、鎌倉市教育委員会、
横須賀市教育委員会、厚木市教育委員会、逗子市教育委員会、葉山町教育委員会、
三浦市教育委員会、京都府教育委員会、京都市教育委員会、舞鶴市教育委員会、
福知山市教育委員会、阿南市教育委員会、徳島県教育委員会、熊本県教育委員会、
熊本市教育委員会、益城町教育委員会、御船町教育委員会、合志市教育委員会、
阿蘇市教育委員会、玉名市教育委員会、大牟田市教育委員会、
ワイズメンズクラブ国際協会 東日本区・西日本区

ウォーター セーフティー
WaterSafety

ハンドブック 2019

じぶん まも たいせつ
自分のいのちを守り、みんなのいのちを大切に

なまえ

自分のいのちを守り、 みんなのいのちを大切に

YMCAのアクアティックプログラムでは、水上安全教育を通して

かけがえのない「いのち」を守り育てることを目的に活動しています。

子どもたちは成長するにつれ、水との様々な関わりを広げていきます。

YMCAでは子どもたちへ、水難事故を防ぐために必要な知恵を授け、

身を守る術を伝えていくことが、私たちの大切な働きであると考えています。

日本では1880年に東京で始まり、現在では北海道から沖縄まで
200を超える拠点で、約14万人の会員とともに活動を行っています。

2018年度 ウォーターセーフティーキャンペーン 活動実績

実施項目

| 内容 | 参加者数 | 割合 |
|-----------|---------|-------|
| 着衣泳 | 19,736名 | 72.8% |
| 心肺蘇生法講習 | 6,984名 | 25.8% |
| 25m チャレンジ | 93名 | 0.3% |
| 安全講習 | 197名 | 0.7% |
| その他 | 105名 | 0.4% |

受講総数 27,115名


対象

| 対象 | 参加者数 | 割合 |
|--------|---------|-------|
| YMCA会員 | 12,583名 | 46.4% |
| 一般幼児 | 1,079名 | 4.0% |
| 一般児童 | 8,325名 | 30.7% |
| 教員 | 630名 | 2.3% |
| 保護者 | 167名 | 0.6% |
| その他 | 4,331名 | 16.0% |


受講総数 27,115名

水の事故は、こんなとき・こんなところでおきています。

水死者の行為別発生状況(夏期)



水死者の場所別発生状況(夏期)



(2018年警察庁資料より)

保護者の方へ

水の事故は未然に防止することが最も大切です。事故の多くは、ちょっとした不注意や水遊びのルールを守らないこと、無謀な行為、知識・技能の不足によって発生しています。子どもだけで水辺へ遊びに行かないよう、約束をしておくことが大切です。水遊びの時には保護者が一緒にいて、危険な箇所を教えてあげること、保護者が正しい模範を示すことが事故の未然防止につながる安全教育なのです。

君は知らないうちに こんなあぶないことをしていませんか？

海や川で

夏になると、海や川に行ったり、水遊びをしたりすることが多くなります。しかし水の中は、陸上とは違って、ちょっとした不注意でケガをしたり、生命を失ったりすることがあります。この絵のお友だちはどうして危ないのでしょうか？みんなで考えてみよう。



① 沖にむかって泳ぐ

② 子どもだけでボートにのる

③ 足がつかないところで遊ぶ

④ 河口のそばで遊ぶ

遊泳禁止
No Swimming
遊泳禁止場所、
遊泳禁止発令時は泳がない

遊泳禁止
No Swimming

⑤ 川沿いの草が
おいしげっている
ところで遊ぶ



りがんりゅう
離岸流

岸から沖に向かって流れる水の流れ



ぎやくせんりゅう
逆潜流

岸によせてきた波が海底の傾斜に沿って沖に戻る水の流れ



ちようせき
潮汐

海水面が昇降する現象

⑦ 大きな岩や
消波ブロックの
そばで遊ぶ

⑥ つきそいの大人の人から
遠くはなれたところへいく

⑧ 自然災害（台風、地震、雷など）の可能性があるときには、水辺には近づかないようにしましょう。注意報や警報が出ていないか、その地域の避難場所はどこかなどを確認してください。

プールで



② 後かたづけをしない

① 飛び込んで遊ぶ

③ プールサイドを走る

⑦ 台の下に
もぐって遊ぶ

④ 足がつかないところで
浮具につかまって遊ぶ

⑥ 熱があるのに
泳ぐ

⑤ 悪ふざけをする

保護者の方へ

子どもたちは、危険な行為や危険な場所であるかどうかの判断ができません。遊びに熱中すると周囲の状況が目に入らなくなってしまいます。お子さまと、この絵の子どもたちがどうして危ないのか話し合ってみてください。そしてその理由を保護者の皆さんからしっかり伝えてあげることが水の事故防止につながります。また、子どもたちは遊びたい一心で具合が悪いのに我慢してしまうことがあります。楽しい水遊びが原因で病気になってしまわないよう、健康チェックを済ませてから水遊びをする習慣をつけましょう。

健康チェック項目

- 熱はないか
- 風邪をひいていないか
- 疲れている様子はないか
- 食欲はあるか
- 顔色はよいか
- 目や耳の病気はないか
- 寝不足ではないか

おぼれている人をみつけたらどうするの？

子どもたちだけでは助けない、水の中に入らない。

「おぼれている人」や「誤って水に落ちてしまった人」を見つけたときの対処法

①119番へ連絡しよう

連絡できたら指示を聞く。

連絡できなければ、連絡できる人を探しに行く。

※携帯電話を持っている人に知らせましょう。



救急隊が到着するまでにできること

②浮く物を投げる

浮く物がある場合は、お腹を目がけて投げて、つかまらせてあげてください。



保護者の方へ

救助の基本は、救助者自らの生命を守ることです。第一に「決して子どもだけで助けようとせず、近くの大人の人に大声で知らせ、助けを求める」、第二に「付近に大人の人がいなかった場合、こんな方法が安全な助け方だよ」という順序で教えてあげてください。繰り返し教えてあげることが大切です。また、海での事故の場合は、118番（海上保安庁）へ通報ください。

〈参考〉大人ができる安全な救助法

大原則として水の中には絶対入らない！！

水の中に入ることによって2次災害※につながり命を落とす危険性が高まります。
※水の中に入っている救助により自分自身が被害にあうケース

水の中に入らずに大人ができることは？

①近くに物※がない場合

※棒、板、きれ、縄など

引き込まれないように岸に腹ばいになり手を伸ばして引き寄せます。

手がとどきそうもないときは自分が身につけている服（シャツ・ズボン・ベルトなど）をつなげてロープ代わりにします。

そして、陸からおぼれている人に渡し、引き寄せます。




②救助用品がある場合

素早くロープの輪を重ねて作る。ロープの端はしっかり足で踏んでおきます。



下手投げで、おぼれている人の後方に落ちるように投げます。

しっかりつかまったら静かに引き寄せます。




※ペットボトルでさくせいかのう作成可能

ちやくいえい
着衣泳



ちやくいえい なに
着衣泳って何？

ちやくいえい
着衣泳というのは
いふく ふだんぎ き およ
衣服（普段着）を着て泳ぐことなんだよ。



ふく き およ
どうして服を着たまま泳ぐの？

ふく き たまま で、とつぜんみず なか お
服を着たまま、突然水の中に落ちると、びっくりしてパニックになり、おぼれてしまうことがあります。
そんなことにならないように、服を着たまま水の中に入ると、どんな感じになるか体験し、
どうすればいいかを知っておくためにするのです。

Lesson1

ふく き みず なか
服を着たままで水の中に入るとどうなるか体験しよう

あさ あし ほど ところ にゆうすい
浅い（足の届く）所からゆっくり入水し、
ある 歩いたり、もぐったりしてみよう。服を着て水の中に入ると、
どんな感じなのかを確かめてみましょう。

みず ていこう かん
水の抵抗を感じるために、
ながそで なが けいけん
長袖長ズボンなどでも経験してみましよう



とつせん みず なか お 突然水の中に落ちてしまったら!?

なにより大切なことは落ち着くことです。

あわててしまうことで泳げる人でもおぼれたり、
心臓が止まったりすることがあるためです。

おちついてうみ
落ちついて浮き身の
しせい
姿勢をとる

きし とお たか ばあい
岸が遠い、高い場合

う 浮いて待つ
う 浮くものがあれば、胸の前で持つ

きし ちか ひく ばあい
岸が近い、低い場合

さし もど 岸まで戻る
エレメンタリーバックストロークなどで戻る

Lesson2

みず おちたらおちついて
水に落ちたら落ち着いて
うみ 浮き身のしせい
浮き身の姿勢をとろう

だいげんそく
大原則は
「浮いて、待とう!」




みず じこ おお きし いな
水の事故の多くは岸から3m以内でおきています。

それは誤って水に落ちてしまったことにより気が動転してしまい、

岸に戻りたくても戻れないからです。誤って水の中に落ちてしまったら、あわてて岸に
戻ろうとするのではなく、まず落ち着いて浮き身（背浮き）の姿勢をとりましょう。


1

うみ 浮き身
せう 背浮き



2

う 浮くものを
むね まえ も
胸の前に持つ



うみ 上手につくるポイント 浮き身

- おなかをしずめない
- 手足をまげない
- 頭のうしろを水につける
- 全身の力を抜く

Lesson3

さんこう
参考

エレメンタリー バックストローク

エレメンタリーバックストロークは、衣服を着て泳ぐ場合に適した
泳ぎ方です。呼吸がしやすく、長く泳ぎ続けることができます。



1

せう しせい
背浮きの姿勢をとる



2

てあし ま
手足を曲げる




3

て ひら みず あし うら みず
手の平で水をかき足の裏で水をける



4

せう じょうたい もど
背浮きの状態に戻る



たお ひと 倒れている人がいたら あわてずに ①②③ の順によく調べてその人の状況に応じて手当をします

1 反応があるかないかを調べる

はんのう 反応があるかないかを しら 調べる

だいじょうぶ 大丈夫ですか?

■手で両肩を軽くたたきながら耳元で呼びかける (名前がわかれば名前を呼ぶ)

この時に できれば救急車を呼んでおこう また、AEDを手配しよう

ひつよう 必要な おうきゅうてあて 応急手当

Ambulance

きゅうきゅうしゃ よ 救急車を呼ぶ

おお 大きな声で協力を 求めましょう。

119番 お願いします!!

AED 持ってきて!!

2 呼吸の確認

こきゅう かくにん 呼吸の確認

しょうびょうしゃ けがたが 傷病者が普段どおりの呼吸 (正常な呼吸) をしているかどうかを確認する。

■10秒以内で、胸や腹部の上がり下がりを見る。

ポイント

次のいずれかの場合には、「普段どおりの呼吸(正常な呼吸)なし」と判断する。

- 胸や腹部の動きがない場合
- 約10秒間確認しても呼吸の状態がよくわからない
- しゃくりあげるような、途切れ途切れに起きる呼吸

呼吸の確認に迷ったら、すぐに胸骨圧迫をする。

3 胸骨圧迫30回と人工呼吸2回の組み合わせをくり返す

きょうこつあつぱく かい じんこうこきゅう かい 胸骨圧迫30回と人工呼吸2回の組み合わせをくり返す

■圧迫は強く、速く(100~120回/分) 絶え間なく圧迫解除は胸がしっかり戻るまで

■AEDが届いたらすぐに使う準備を始める

■心肺蘇生法を中止するのは


- 心肺蘇生法を続けているうちに傷病者がうめき声を出したり、普段どおりの息を始めた場合
- 救急隊に心肺蘇生法を引き継いだとき

正常な呼吸(普段どおりの息)をしていれば

かいふく たいい 回復体位

■反応はないが正常な呼吸をしていたら、窒息しないように横向きに寝かせ、下顎を前に出して、上の方の肘と膝を軽くまげる。

様子を見ながら、救急車を待ちます



Circulation

きょうこつあつぱく 胸骨圧迫 (心臓マッサージ)

手のひらの付根で 胸骨の指定の部位を圧迫する

30回の胸骨圧迫と2回の人工呼吸をくり返します。

※強く(約5cm)速く(100~120回/分)絶え間なく(中断を最小限に)

Airway・Breathing

きどうかくほ じんこうこきゅう 気道確保・人工呼吸

意識がなくなると、舌の舌をふさぐので 空気の通り道を開通させ窒息を防ぎます。

気道を確保するには、片手を額に当て もう一方の手の人さし指と中指の2本をあらかじめ当て頭を後ろにのけらせあご先を上げます。

※人工呼吸の技術と意思があれば行つたが、できない状況では 胸骨圧迫のみを行う

30対2の割合で セットをくり返す

相手の口を自分の口でおおい鼻をつまんで 胸が軽くふくらむ位の息を約1秒かけて吹き込みます。これをもう一回くり返します。

AEDの準備ができたなら電源を入れ、音声メッセージに従い電気ショックを実施する

おぼえよう！人の生命の助け方

一次救命処置 (BLS) の手順

一次救命処置 (BLS: Basic Life Support) とは心肺蘇生 (胸骨圧迫と人工呼吸) や AED を用いた除細動など、心臓や呼吸が停止した人を助けるために行います。呼びかけても反応がなく、普段どおりの呼吸がなかったら、生命の危険が迫っています。すぐに以下のことをしましょう。

- ① 協力者を呼びかける・・・119番通報してもらおう・AEDを持ってきてもらおう
- ② 心肺蘇生をする

◆ 傷病者 (呼びかけに反応がなく、普段どおりの呼吸がない人) を見つけたら

◆ 心肺蘇生の方法① 胸骨圧迫


胸骨を圧迫し、血液を循環させる
胸の真ん中 (胸骨の下半分) を圧迫する



胸骨圧迫は、胸の真ん中 (胸骨の下半分) を圧迫します。肘をまっすぐ伸ばし、体を前傾させ、胸骨に垂直に力が加わるようにします。圧迫と圧迫の間 (圧迫を緩めている間) は、胸が元の高さに戻るところまで十分に圧迫を解除することが大切です。(※図1)

胸骨圧迫の大切なこと

- 胸の真ん中 (胸骨の下半分) を圧迫する
- 胸が約5cm沈むように圧迫
- 6cmを超えないようにする
- 速く (1分間に100~120回のテンポで)
- 胸骨圧迫を中断する時間を最小限にする
- 押したらしっかりと胸を元に戻す



乳児の場合
胸の真ん中 (胸骨の下半分) の少し足側を中指と薬指2本で、胸の厚みの1/3が沈む程度圧迫します。

幼児の場合
胸の真ん中 (胸骨の下半分) の少し足側を胸の厚みの1/3が沈む程度圧迫します。体格に合わせて片手で、若しくは両手で圧迫します。

※体格に合わせて十分に圧迫できれば、両手で片手でもよい。

◆ 心肺蘇生の方法② 人工呼吸

息を吹き込んで、呼吸を助ける

気道確保をしながら鼻をつまみ息を吹き込む



乳児は口と鼻をおおい息を吹き込む



2本の指でアゴをおしあげる

ひたいに手をあてる



人工呼吸
※人工呼吸の技術と意思があれば行うが、できない状況では胸骨圧迫のみを行う

気道確保をして、約1秒かけて胸が上がるのが確認できる量の息を2回吹き込みます。乳児の場合は自分の口で乳児の鼻と口を一度に覆う「口対口鼻人工呼吸」を行います。

気道確保 (あご先を上にあげ空気の通り道を広げる) をして人工呼吸を行います。

鼻をつまみ胸のふくらみを見ながら、静かに大きく連続して (気道の開通を確かめながら) 2回吹き込みます。口と口が直接接触することで、ウイルスなどの感染が考えられる場合は、人工呼吸を省略して胸骨圧迫のみを続けてください。

口対口人工呼吸の大切なこと

- 胸が上がるのが見えるまで
- 約1秒かけて吹き込む ・吹き込みは2回
- 呼吸の確認に迷ったらすぐに胸骨圧迫をする



胸骨圧迫 30回
人工呼吸 2回 } をくりかえす

保護者の方へ

呼びかけても反応がなく、普段どおりの呼吸がないときには、まさに生命の危機が迫っており、速やかに胸骨圧迫、人工呼吸などの応急手当が必要です。かつ、医療機関へ引き継ぐまで絶え間なく続けることが重要で、いかに早く心肺蘇生に着手できるかが救命のポイントです。いつ、どのような事故が子どもや家庭を襲うかわかりません。保護者として、心肺蘇生を速やかに確実に実行できるよう一次救命処置の講習会を受講されることをおすすめします。**119番通報した際に電話を切らずに指示を仰ぎましょう。**

◆ AED (自動体外式除細動器) を用いた除細動

傷病者が普段どおりの呼吸をしていない場合、心臓は細かく震えだす「心室細動」をおこしていることが多くあります。心臓を正常な動きに戻すためには電気ショック (除細動) が必要です。AEDと合わせて心肺蘇生を行うことが必要です。

① 電源を入れる

電源を入れたら、音声指示と点滅するランプに従って操作します。




② 電極パッドを貼る

傷病者の胸の衣服を取り除き、AEDに付いている電極パッドを袋から取り出します。電極パッドの一枚を胸の右上 (鎖骨の下) に、もう一枚を胸の左下側 (脇の下5~8cm下) に貼ります。

電極パッドは

- 肌にしっかりと密着させる
- 濡れている場合はタオルで拭く
- 小児 (6歳未満) では、小児用電極パッドを使用する



(小児用電極パッドがないときは、成人用電極パッドを代用するが、心臓を挟むように胸と背中に貼り、電極パッド同士が接触しないようにする)

③ 心電図の解析

AEDの音声指示により心電図の解析を自動的に始めます。傷病者に触れないようにしてください。



④ 電気ショックと心肺蘇生

電気ショックが必要な場合はAEDの音声指示によりショックボタンを押します。傷病者に触れないようにしてください。



⑤ 心肺蘇生とAEDの繰り返し

AEDの音声指示により必要であれば心肺蘇生を行い、心電図解析や電気ショックを行う場合は傷病者に触れないようにしてください。AEDの電極パッドは貼ったまま、電源は入れたまま心肺蘇生を続けます。

